

## ENGRAIS SPÉCIAL BONSAÏS

NPK : 2-5-12 + 15,5 CaO + 4,8 MgO + 21,9 SO<sub>3</sub>

### FORMULATION DE TRÈS HAUTE QUALITÉ

Une nutrition adaptée à la fin de saison pour préparer vos bonsaïs au repos hivernal.



SOLU.FR  
TOUTPOURLESNUISIBLES.COM  
PENNTYBIO.COM

**Traiter juste. protéger mieux**

K3D SARL - 04 74 05 25 56

31 allée de la Poste, 42470 Saint Symphorien de Lay

Siret : 499 312 023 | N° agrément : RH02399

**info@solu.fr**

- **Azote (N : 2%)** : Accompagne la fin de croissance sans stimuler excessivement la végétation.
- **Phosphore (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> : 5%)** : Participe au développement racinaire et au métabolisme énergétique.
- **Potassium (K<sub>2</sub>O : 12%)** : Contribue à la régulation hydrique et à l'adaptation aux variations climatiques.
- **Magnésium (MgO : 4,8%)** : Favorise la photosynthèse et le maintien d'un feuillage vigoureux.
- **Calcium (CaO : 15,5%)** : Participe à la structure des tissus et au fonctionnement cellulaire.
- **Soufre (SO<sub>3</sub> : 21,9%)** : Contribue à la synthèse des protéines et au métabolisme végétal.

## Solu'Control Bonsaï Automne & Hiver convient principalement

**aux bonsaïs d'extérieur à cycle saisonnier, notamment :**



### Érable japonais



Pin



**Olivier**



## Ficus



## Genévrier



## Orme de Chine



## Camélia



## Charme



Zelkova

**Attention :** cette formule riche en calcium n'est pas recommandée pour les espèces acidophiles telles que les azalées, les rhododendrons et les camélias.

Pour les bonsaïs tropicaux cultivés en intérieur, privilégier une fertilisation adaptée à leur croissance et à leurs conditions de culture.

## DOSAGES ET MODE D'APPLICATION

**Dosage indicatif : 1 g d'engrais par litre de substrat.**

### Mode d'application

1. Mesurer la quantité d'engrais en fonction du volume de substrat.
2. Répartir uniformément les granulés à la surface, en évitant tout contact direct avec le tronc et les racines apparentes.
3. Arroser délicatement après application.
4. Maintenir un arrosage adapté à l'espèce, au substrat et aux conditions climatiques.

Ne pas dépasser les quantités recommandées. Les bonsaïs cultivés dans des substrats très drainants nécessitent une attention particulière.

## PÉRIODES D'APPLICATION

### Fin d'été – Août à septembre

Appliquer lorsque le bonsai est encore en activité végétative, afin d'accompagner la transition entre la croissance estivale et l'automne.

### Automne – Septembre à novembre


Période principale d'utilisation. Appliquer tant que l'arbre conserve une activité végétative et que les conditions climatiques permettent l'absorption des nutriments.

Une seconde application peut être envisagée 4 à 6 semaines après la première, uniquement si elle est nécessaire et après validation de la fréquence d'emploi.

### Hiver – Décembre à février

Suspendre la fertilisation pendant la dormance complète des bonsaïs. Ne pas fertiliser lorsque le substrat est gelé ou que les racines ne sont plus en activité.

## COMPOSITION



## STOCKAGE ET PRÉCAUTIONS D'USAGE

- Conserver dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et à l'abri des UV (température entre 5 °C et 35 °C).
- Produit non destiné à l'alimentation humaine ou animale.
- Tenir hors de portée des enfants.